

一般用医薬品 「使用上の注意」改訂のお知らせ

第2類医薬品

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛

ナボリン® フェルビナク70

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品「ナボリン® フェルビナク70」について、「使用上の注意」を下記のとおり改訂いたします。本剤のご使用に際して、お客様が「使用上の注意」の各項を十分ご理解いただくよう、ご説明のほどお願い申し上げます。

なお、改訂した製品が届くまでには、在庫の関係から日数を要する場合がございます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

2014年2月

製造販売元 救急薬品工業株式会社

発売元 エーザイ株式会社

記

■ 製品：ナボリン® フェルビナク70

1. 「使用上の注意」改訂内容（下線部分が追記となります）

相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

2. 改訂理由

厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（平成26年2月18日付、薬食安発0218第1号）に基づき、当該製品の「使用上の注意」の「相談すること」の項に、重篤な症状として「ショック（アナフィラキシー）」を追記しました。

以上

製品に関するお問い合わせ先：エーザイ hhcホットライン フリーダイヤル 0120-161-454

受付時間／平日 9：00～18：00（土・日・祝日 9：00～17：00）

ナボリン® フェルピナク70

改訂後の「使用上の注意」記載内容

してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる]

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし、たむし等又は化膿している患部
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(※下線部分が追記となります。)